

BRUKSANVISNING



Läs noga bruksanvisningen innan användning.

Endast för utvärtes bruk.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

1. Vad VårtFri är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder VårtFri
3. Hur du använder VårtFri
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring och övriga upplysningar

Scanna koden för att lära mer om hur VårtFri används



Becur VårtFri™

1. VAD VÅRTFRI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

VårtFri är ett effektivt vårtborttagningsmedel för behandling av vårtor på händer, fötter och kropp (t.ex. armbåge och knä) på både barn och vuxna. VårtFri hjälper kroppen att torka ut och stöta bort vårtor. VårtFri absorberas direkt in i vårtan och lösningen lämnar inga spår på huden. Du kan genast efter applicering ta på t.ex. strumpor eller bada.

VårtFri är en svensk patenterad och CE märkt medicinteknisk produkt som är biologiskt nedbrytbar. VårtFri är bakteriedödande och vid korrekt användning ger VårtFri inga ärr eller infektioner. En flaska VårtFri (5ml) räcker till ca 30 behandlingar för 1-5 vårtor.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER VÅRTFRI

2.1 ANVÄND INTE VÅRTFRI

- Använd inte på ansiktsvårtor, könsvårtor, mollusker, leverfläckar, liktornar, hudförhårdnader eller andra hudförändringar.
- Använd inte om behandlad vårta blir öm, svullen, sårig eller blöder eller om huden blir irriterad. Gör uppehåll i behandlingen tills huden är återställd.
- Använd inte i kombination med andra vårtborttagningsmetoder.
- Använd inte plåster i kombination med VårtFri. Plåster kan orsaka ömhet eller skada på huden, se 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
- Använd inte om du är överkänslig mot något innehållsämne i VårtFri.

2.2 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET



VårtFri är frätande med irriterande och stark lukt. Får inte drickas eller inandas. **Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.**

Överdosera inte! Felaktig användning eller överdosering kan ge upphov till smärta och hudskador, se 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR.

- du överdoserar eller av misstag spiller VårtFri på huden, skölj genast rikligt med vatten för att minska hudskada.
- Om du får stänk i ögat, spola rikligt med ljummet vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare eller ring 112

Var särskilt försiktig vid behandling på tunn hud, t.ex barn och ovasida händer, se 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING.

3. HUR DU ANVÄNDER VÅRTFRI

3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING

Det behövs ytterst lite lösning för att VårtFri ska vara verksamt. Läs instruktionen nedan noga eftersom lösningen är frätande. Använd alltid medföljande tops för applicering. Var varsam med flaskan för att undvika spillolycka. Håll inte flaskan i handen under behandling. Ställ flaskan på diskbänk eller liknande. Spill kan orsaka hudskada eller skador på målade ytor, textilier mm. Skruva på korken ordentligt efter användning. Använda tops spolade med vatten innan de kastas.

1. Doppa topsen i VårtFri, stryk noggrant av mot flaskkanten. Topsen ska endast vara fuktad.
2. Tryck lätt med topsen på vårtan 2-3 gånger. Akta huden runt om.
3. Behandla **regelbundet** en gång i veckan tills vårtan är borta, annars stannar processen upp.

Vid behandling av **gamla och/eller stora vårtor** hos vuxna kan man efter 4-5 veckor börja behandla var femte dag om huden inte är irriterad. **Överdosera inte.**

Vid behandling av vårtor på **tunn hud** kan det ibland räcka med mindre mängd lösning. Doppa alltid topsen på en bit mjukt papper innan behandling. Behandla mer sällan, såsom varannan eller var tredje vecka.

Vid behandling av **många vårtor** (fler än fem), börja med att behandla ett par stycken i ett par veckor. Om huden är opåverkad kan du börja behandla ytterligare vårtor. Flera små vårtor kan behandlas på samma gång utan att doppa topsen på nytt i VårtFri (ett dopp räcker till 3-5 vårtor, ibland fler beroende på storlek). Börja med de största vårtorna.

Håll vårtan mjuk mellan behandlingarna genom att smörja in med vanlig hudlotion eller olja. Då kan vårtan lättare komma ut.

Vårtan kan vitna och växa ut inledningsvis, innan den börjar torka ut. När vårtan utvidgas kan det ömma i den omgivande huden. Se till att vårtan inte täcks av hud, se nedan.

Skulle vårtan kännas öm, eller det dunkar i den, kan det bero på att man haft på för mycket vårtmedel, se 2.1 ANVÄND INTE VÅRTFRI eller att vårtan inte kan komma ut genom huden som täcker vårtan. Om huden ligger som ett lock över vårtan, måste man göra en öppning i huden t.ex med en pincett och släppa ut vårtan. Har du en gammal eller hård vårta, blötlägg området före behandling i varmt vatten tills huden är mjuk. Peta eller rugga upp huden på vårtan t ex med pincett. Vid tjock hud på inåtgående fotvårtor, avlägsna försiktigt bort hård hud. På nagelbandsvårtor kan det behöva göras ett litet hål i yttersta huden så att medlet kan komma in i vårtan. Fila inte på vårtorna. Vårtorna kan bli ömma och det bildas ny hård yta på vårtan.

Efter några behandlingar syns oftast svarta prickar i vårtan. Det är små blodkärl som förser vårtan med blod. Det är tecken på att vårtan är på väg att försvinna och behandling skall fortgå tills svarta

prickarna och vårtan är helt borta. Ibland kan de svarta prickarna blöda lite då du skrapat på vårtan. Vänta några minuter med att applicera VårtFri tills det slutat blöda, annars kan det svida. Om det svider, ha på kallt vatten för att lindra obehaget.

3.2 BEHANDLING AV BARN

Behandling av barn skall alltid utföras av en vuxen. Följ anvisningarna för applicering i 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING noga då lösningen är frätande. Små barn har mjuk och tunn hud. Använd ytterst lite VårtFri på barnvårtor. Ett dopp i lösningen räcker till fler vårtor. Vårtorna är oftast borta efter 2-3 behandlingar.

Barn **under 4 år** kan behandlas med VårtFri men säkerställ alltid att det verkligen är en vårta och inte någon annan typ av hudförändring. Rådgör med din läkare eller BVC före behandlingen. För barn under 4 år är det extra viktigt att minska doseringen. Behandla mer sällan, såsom varannan eller var tredje vecka.

- Doppa alltid av topsen på en bit mjukt papper innan du lätt stryker ett par gånger på vårtan.
- Om barnet kommer åt att slicka på vårtan kan man tvätta av det behandlade området eftersom VårtFri tränger in direkt.
- Om det skulle svida eller sticka till vid behandling, skölj vårtan med kallt vatten och sätt inte på mer medel. Det har redan hunnit gå ner i vårtan.

3.3 BEHANDLING AV PERSONER MED DIABETES

Diabetiker ska enbart använda VårtFri på vårtor på frisk hud (oskadad och av sjukdom opåverkad) och med extra försiktighet. Vid besvär, rådgör alltid med din läkare/sköterska eller fotvårdsspecialist.

3.4 HUR LÄNGE SKA VÅRTFRI ANVÄNDAS

VårtFri är mycket effektivt – de flesta vårtor går bort och kommer inte tillbaka. Ibland kan dock nya vårtor som inte syns (som funnits under huden) komma fram då du börjar behandla.

Vårtor kan se olika ut det kan ta olika lång tid att ta bort dem. Vanligast är 5 till 15 behandlingar, men det kan också ta kortare eller längre tid. Faktorer som kan påverka hur lång tid du måste behandla innan vårtorna försvinner är din ålder, vilken sorts vårta det är, ditt immunförsvar, var vårtan sitter och hur länge du haft den. Nedsatt immunförsvar och medicinering med t.ex. kortison kan göra att det tar längre tid att bli av med vårtorna. Nya vårtor är oftast enklare att ta bort än gamla vårtor. Barnvårtor är oftast lättare att ta bort än vuxenvårtor. För inåtgående fotvårtor och nagelbandsvårtor som suttit många år kan det ta lång tid innan man ser en tydlig effekt av behandlingen och det tar betydligt längre tid innan vårtan är helt borta.

3.5 NÄR SKA JAG SLUTA BEHANDLA MED VÅRTFRI

Sluta med VårtFri när inga svarta prickar syns eller om vårtan har ramlat bort, skrumpnat ihop eller det är en ”grop” där vårtan suttit. Huden blir slät efteråt. Fortsätter man behandla för länge efter att vårtan är borta blir huden lätt rosa och lite vattnig. Sluta då genast att ta på mer VårtFri. Titta efter några veckor där vårtan suttit, finns vårtrester kvar syns en liten prick. Behandla då med VårtFri ett par gånger till.

3.6 VID GRAVIDITET OCH AMNING

Inga kända risker finns vid graviditet och amning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

VårtFri innehåller en stark syra som vid överdosering, felanvändning eller spill ger frätskada på huden. Följ anvisningarna för applicering i 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING för att undvika risken för hudskador.

Mindre allvarliga, övergående biverkningar på det behandlade området kan förekomma, som t ex ömhet, stickning, sveda, rodnad, smärta, brännande känsla, blödning från blodkapillärerna. Gör uppehåll i behandlingen tills huden är återställd.

Vid överdosering, felanvändning eller spill kan kraftigare hudreaktioner uppstå, t ex blåsor, sår, mörk pigmentering av huden, kemisk brännskada, inflammation, vävnadsdöd (nekros), ärrbildning. Det skadade området ska hållas rent för att det inte ska bli infekterat. Avbryt behandlingen och vid kraftigare skada kontakta läkare.

VårtFri har stark lukt som kan vara irriterande för andningsvägar och ögon. Lukta inte på innehållet i flaskan. Biverkningar kan vara t ex irritation i luftvägarna och/eller hals, rinnande snuva, rinnande ögon, andnöd.

I enstaka fall har överkänslighetsreaktioner som t ex rodnad, utslag och klåda rapporterats.

5. FÖRVARING OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förvaring: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i rumstemperatur (15-25°C), inte i direkt solljus.

Innehåll: Ofärgad till svagt gul lösning (myrsyra, vatten, glycerol, citronolja).

Förpackning: Glasflaska med barnsäker skruvkork, bruksanvisning och tops för applicering.

Hållbarhet: Se datummärkning på flaskan och ytterförpackningen.

Denna bruksanvisning ändrades senast februari 2014.

Besök gärna vår hemsida www.vartfri.se